使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

タケダ

ベンザ®鼻炎スプレー

鼻炎用点鼻薬

第２類医薬品

特　徴

- 花粉・ハウスダストによるアレルギー性鼻炎などの鼻づまり・鼻水によく効くスプレータイプの点鼻薬です。
- 塩酸テトラヒドロゾリンが、鼻粘膜の充血やハレをおさえ、鼻の通りを改善します。
- 清涼化剤メントールの香りで、鼻がスッキリします。
- 一定量の薬液を圧縮空気により押し出す容器なので、鼻水などが逆流せず衛生的です。
- 無色澄明の薬液で、携帯に便利なスリムな容器です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

長期連用しないこと

相談すること

1.次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦または妊娠していると思われる人。
（3）本人または家族がアレルギー体質の人。
（4）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（5）次の診断を受けた人。
　高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

（1）使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症　　状
皮　ふ	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

（2）3日間位使用しても症状がよくならない場合

効　能

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎または副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

用法・用量

次の用法・用量で使用すること

年　　齢	1回量	1日使用回数
7歳以上	1～2度ずつ鼻腔内に噴霧	3時間以上の間隔をおいて6回まで
7歳未満	使用しないこと	

（裏面へ続く）

＜用法・用量に関連する注意＞
(1)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがある。用法・用量を厳守すること。
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(3)点鼻用にのみ使用すること。
(4)目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。

〔容器の使用方法〕

●初めてご使用の際は、容器の構造上薬液が霧状になりにくいので、ノズル(容器の先端部分)を上に向け、薬液が霧状になるまで繰返し押してください。

①

キャップをはずしてください。

②

まっすぐ上向きに持って、ノズル(容器の先端部分)を軽く鼻孔内に入れてください。

③

レバーを指で下まで強く、素早く押してください。(弱く、ゆっくり押すと、薬液が霧状にならず、液だれの原因となります。)

ノズルを下向きや横向きで使用したり、レバーを弱く、ゆっくり押したりしないでください。(圧縮空気が抜けて噴霧できなくなることがあります。)

●使用後は、清潔なガーゼなどでふきとり、キャップをして保管してください。
●容器の中に少量の薬液が残りますが、残量を見込んで充填しています。

成　分　1mL中

は　た　ら　き	成　　分	含 量
充血やハレをおさえ、鼻づまりを改善する	塩酸テトラヒドロゾリン	1mg
鼻づまり、鼻水、くしゃみに	クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg
鼻腔内を清潔にし、鼻づまりなどの緩和をたすける	ベンゼトニウム塩化物	0.2mg
かゆみなどの鼻の不快感をやわらげる	リドカイン	5mg

添加物：グリセリン、エデト酸ナトリウム水和物、l-メントール、香料、マクロゴール、pH調整剤

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。
(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
(4)他の人と共用しないこと。
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。
(6)温度が上がる所には、破裂する危険があるので、置かないこと。
(7)捨てる際には、戸外で噴霧音がしなくなるまで圧縮空気を抜くこと。



包　装　14mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申しあげます。
武田薬品工業株式会社　ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668　東京都中央区日本橋二丁目12番10号　☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

●タケダ健康サイト(パソコン用)　http://takeda-kenko.jp
●タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用)　http://tkdm.jp

製造販売元　武田薬品工業株式会社
〒540-8645　大阪市中央区道修町四丁目1番1号