

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# アパインローション<sup>®</sup>

## 外用鎮痛消炎薬

### 特徴

第2類医薬品

- 非ステロイド性の消炎鎮痛成分フェルピナクが皮膚から浸透して、炎症を起こした筋肉や関節に直接はたらきます。
- フェルピナクは、痛みや腫れに関係する物質(プロスタグランジン)の産生を抑え、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎などによく効きます。
- 痛みの強い部位にもソフトに塗れます。また、背中や腰などの手の届きにくいところにも塗りやすい容器です。
- 無色澄明・微香性なので、衣服に色がつかず、においも気になりません。さわやかな使用感のローションです。



2~3回重ね塗ると効果的です

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

##### 1. 次の人は使用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

##### 2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) 化膿している患部。



#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

##### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状                    |
|------|------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれ |

- (2) 1週間位使用しても症状がよくなる場合

### 効能

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)

## 用法・用量

1日2～4回、適量を患部に塗布すること。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (2) ラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないこと。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 用法・用量を厳守すること。


## 成分 1mL中

| 成分     | 含量   |
|--------|------|
| フェルピナク | 30mg |

添加物：カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、エタノール、グリセリン、ハッカ油

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと  
(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 火の中に入れてはいけないこと。
- (6) 使用済みの容器は火中に投じないこと。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。  
また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。



## こんなときに…

- 肩こりに伴う肩の痛み
- 長時間の同じ姿勢や無理な姿勢による腰痛
- 節々の痛み(関節痛)
- パソコンの使用などに伴う腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)
- スポーツに伴う肘の痛み、筋肉痛、打撲、捻挫

## 包装 30mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」  
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087  
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号