

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



ロバック[®]S軟膏

非ステロイド性湿疹・皮膚炎用薬

特徴

第2類医薬品

- 非ステロイド性抗炎症剤プフェキサマクを主成分とした肌にやさしい外用剤です。
- かゆみを抑える成分と血行を改善する成分を配合しています。
- しっしん、皮膚炎、かゆみなどの皮膚症状改善にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

目や目の周囲。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 湿潤やただれのひどい人、または化膿している人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、刺激感(ヒリヒリ感)、 光線過敏症(本剤を使用した部位に日光があたって起こる 発疹・発赤等)

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
接触皮膚炎	塗布部に発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ等があらわれ、 これらの症状が全身に広がり、重症化することがある。

- (2) 1～2週間位使用しても症状がよくなる場合、または、本剤の使用により症状が悪化した場合

効 能

湿疹、皮膚炎、かゆみ、かぶれ、ただれ、おむつかぶれ、あせも、日やけに伴うほてり・いたみ・かゆみ、虫さされ、しもやけ


用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布すること。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。
- (4) 用法・用量を厳守すること。

チューブ穴の開け方



キャップを逆にして、キャップの突起部をチューブの先に強く押し当てます。


成分 1g中

成分	含量
ブフェキサマク	50mg
ジフェニルイミダゾール	2mg
トコフェロール酢酸エステル	5mg

添加物：ワセリン

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。



こんな時に……



包装 12g

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号