

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



タケダ漢方胃腸薬A末(分包)

漢方製剤 あんちゅうさん〈安中散〉

特 徴

第2類医薬品

- 漢方処方「安中散」の製剤で、神経性胃炎にすぐれた効果をあらわします。
- 弱った胃のはたらきを高め、慢性胃炎、胃腸虚弱にすぐれた効果をあらわします。
- ふだんから胃腸の弱い人に、好適な胃腸薬です。
- 芳香のあるかっ色の服用しやすい細粒状の製剤です。
- 携帯に便利な分包(アルミ包装)です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 心 | 発疹・発赤、かゆみ |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

効 能

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、胃痛または腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うものの次の諸症：

神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

用法・用量

次の量を、食前または食間に、水またはお湯で服用すること。

| 年 齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|--------|---------|--------|
| 15歳以上 | 1包 | 3回 |
| 7歳～14歳 | 2/3包 | |
| 7歳未満 | 服用しないこと | |



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

(裏面へ続く)

成分 3包(2.1g、15歳以上の1日服用量)中に次の成分を含有する。

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|
| あんちゅうさんりょう 安中散料エキス | 480mg(乾燥エキスとして) | | |
| ケイヒ(桂皮) | 750mg | シュクシャ(縮砂) | 500mg |
| エンゴサク(延胡索) | 750mg | カンゾウ(甘草) | 500mg |
| ボレイ(牡蛎) | 750mg | リョウキョウ(良姜) | 250mg |
| ウイキョウ(茴香) | 500mg | | 上記生薬より抽出 |

| | | | |
|----------------|----------|------------|---------|
| あんちゅうさん 安中散 | 1,500mg | | |
| ケイヒ(桂皮) | 281.25mg | シュクシャ(縮砂) | 187.5mg |
| エンゴサク(延胡索) | 281.25mg | カンゾウ(甘草) | 187.5mg |
| ボレイ(牡蛎) | 281.25mg | リョウキョウ(良姜) | 93.75mg |
| ウイキョウ(茴香) | 187.5mg | | |


添加物：ケイヒ油、ウイキョウ油、香料、トウモロコシデンプン

<成分に関連する注意>

生薬を用いた製品なので、製品により末の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。



包装 16包(0.7g×16)、36包(0.7g×36)

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」
〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087
受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

- タケダ健康サイト(パソコン用) <http://takeda-kenko.jp>
- タケダ健康モバイルサイト(携帯電話用) <http://tkdm.jp>

製造販売元  **武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号