

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



スコルバ®EX液

水虫・たむし治療薬 医薬品

特徴

- 塩酸ブテナフィンが、角質層によく浸透してとどまり、よく効きます。
- かゆみ・痛みをクロタミトン、トメントール、グリチルレチン酸が一時的に抑えます。
- 患部を消毒・清潔にする塩化ベンザルコニウムを配合しています。
- 乾きやすく、サラッとした使用感の無色～微黄色の澄明な液剤です。

1日1回
24時間効果

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと

本剤による過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、浮腫等)を起こしたことがある人。

2. 次の部位には使用しないこと

- (1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。
- (2) 湿疹。
- (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 乳幼児。
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 患部が顔面の人、広範囲の人、または、いんきんたむし等で内股に塗布する人。
- (7) 患部が化膿している人。
- (8) 「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かかはっきりしない人。
(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹) 等他の原因による場合が多い。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症 状 |
|------|---|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感、落屑、ただれ、水疱、亀裂、持続するほてり(熱感) |

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合、または、本剤の使用により症状が悪化した場合

効能


みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

用法・用量

1日1回、適量を患部に塗布すること。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 外用にのみ使用すること。
- (5) 用法・用量を厳守すること。



成分 1mL中

| はたらき | 成 分 | 含 量 |
|------------|------------|-------|
| 白癬菌の殺菌に | 塩酸ブテナフィン | 10mg |
| 患部のかゆみに | クロタミトン | 30mg |
| | グリチルレチン酸 | 5mg |
| 患部のかゆみ・痛みに | トメントール | 10mg |
| 患部の殺菌・消毒に | 塩化ベンザルコニウム | 0.5mg |


添加物：ジイソプロパノールアミン、ミリスチン酸イソプロピル、プロピレングリコール、ラウリン酸マクロゴール、エタノール

<成分に関連する注意>

塗布時にしみることもある。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 火気に近づけないこと。
- (5) 火の中に入れないこと。
- (6) 使用済みの容器は火中に投じないこと。
- (7) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (8) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべくすみやかに使用すること。
- (9) 合成樹脂(スチロール等)を軟化したり、塗料を溶かしたりすることがあるので、床や家具等につかないようにすること。



みずむし・たむし治療に際しての注意

- 患部は常に清潔にしてください。
- 白癬菌などのみずむし・たむしの原因菌は、じめじめした環境を好みます。汗をかいたあとや入浴後には、患部を十分に乾かしてください。
- みずむしは、かゆみなどの症状がなくなっても、白癬菌の一部が生きていることが多く、治療を中止してしまうと再発の原因となります。症状がなくなったあとも、1ヵ月間は根元よく治療を続けてください。

包装 15mL

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社

ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」

〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号

電話 (03) 3278-2430

受付時間：9：00～17：00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 武田薬品工業株式会社

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号