



使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。



# ハイシーBメイト2


ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>製剤 ビタミンC・L-システイン配合

## 特徴

第3類医薬品

肌あれ・にきびを改善する2つの主成分  
脂質やたんぱく質の代謝を助け、体の内側から「肌細胞の生まれ変わり」を助けるビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>

肌あれ・にきびの改善を助ける4つの成分  
コラーゲンの生成に欠かせないビタミンC  
肌の代謝(ターンオーバー)を助けるL-システイン  
脂質の代謝を助けるビオチン  
不足すると肌あれが起こりやすくなるニコチン酸アミド  
1日1回、1回2錠(15歳以上)のみやすい白い錠剤です。  
シュガーレスです。



## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	胃部不快感、悪心・嘔吐、腹痛

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること

下痢

## 効 能

1. 次の諸症状の緩和

肌あれ、にきび

湿疹、皮膚炎、かぶれ、ただれ

口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎

2. 次の場合のビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>の補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

「ただし、上記1の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」

## 用法・用量

次の量を、水またはお湯で、かまずに服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
15歳以上	2 錠	1 回
7歳～14歳	1 錠	
7歳未満	服用しないこと	



<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。


(2) 用法・用量を厳守すること。

(3) 1日1回、いつ服用してもかまいません。

(裏面へ続く)

## ピン入り品、分包品について

## ピン入り品について



## 分包品について

### 「肌細胞の生まれ変わり」について

私達の体は、約60兆個にもものぼる細胞からできており、肌も細胞の集合体です。肌の奥では、新しい肌細胞が次々と生まれて、生まれた肌細胞は一定の期間をかけて徐々に肌の一番外側まで押し上げられ、最終的にはがれ落ちます。

このように、肌細胞は常に新しく生まれ変わっています。

細胞は、主にたんぱく質・脂質と水分から構成されており、肌細胞の生まれ変わりにはたんぱく質や脂質の元となる栄養素やビタミンなどが細胞に十分補給される必要があります。

ビタミンB<sub>2</sub>は脂質の代謝に、ビタミンB<sub>6</sub>はたんぱく質の代謝に関与しており、細胞が新しく生まれ変わるために、大切なビタミンです。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

武田薬品工業株式会社 ヘルスケアカンパニー「お客様相談室」

〒103-8668 東京都中央区日本橋二丁目12番10号 ☎0120-567087

受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

タケダ健康サイト（パソコン用）

<http://takeda-kenko.jp>

タケダ健康モバイルサイト（携帯電話用）

<http://tkdm.jp>

製造販売元



**武田薬品工業株式会社**

〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号